

# NITRATE BALANCER®




- Es un fertilizante líquido formulado para regular el crecimiento vegetativo y mejorar la acumulación de reservas de la planta.
- Favorece la transferencia de fotosintatos (azúcares) desde las hojas hacia los órganos de reserva (tallos, ramas, raíces, yemas, etc.), favoreciendo el ingreso a receso en los frutales de hoja caduca.

## BENEFICIOS

- Acelera la lignificación de los tejidos.
- Aumenta la fertilidad de las yemas.
- Incrementa los niveles de arginina, almidón, fósforo y potasio en tejido de reservas.
- Protege a las plantas de heladas tempranas.
- Favorece un mejor desarrollo de la planta durante la primavera siguiente.
- Detiene el crecimiento vegetativo.

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

Boro (B)	9%
Molibdeno (Mo)	0,005%
Valores expresados en % peso/volumen	
pH	7,5
Densidad (g/L)	1300 g/L a 20°C
Solubilidad (%)	100% a 20°C



**“MOVILIZADOR DE CARBOHIDRATOS Y NUTRIENTES A ESTRUCTURAS DE RESERVA”**

# NITRATE BALANCER®



## Instrucciones de Uso

Cultivo	Dosis	Aplicación
Duraznero, Nectarin, Manzano, Peral, Kiwi, Nogal, Almendro, Ciruelo, Damasco, Arándano, Cerezo, Uva de Mesa y Viñas.	4-6 L/ha	Aplicar desde la primera quincena de abril, cuando las temperaturas comiencen a disminuir y se acorte el fotoperíodo, cuando las hojas comiencen el proceso de senescencia (amarillamiento).
Avellano Europeo	4-6 L/ha	Aplicar después de cosecha para inducir receso invernal y aumentar reservas.
Papas	1 L/ha 1 L/ha 4 L/ha	Aplicar en tuberización. Aplicar 10-20 días después de la aplicación anterior. Aplicar en llenado de tubérculos (parcializar la aplicación dependiendo de las condiciones del cultivo y su desarrollo).
Frutillas	2- 4 L/ha	Aplicar según necesidad de controlar vigor vegetativo.
Plantaciones nuevas y viveros	0,5-1L/ 100 L de Agua	Para la lignificación de tejidos y acumulación de reservas, realizar la primera aplicación cuando las temperaturas comiencen a disminuir y se acorte el fotoperíodo, realizar una segunda aplicación según necesidad.
Frutales	0,5 L/100 L agua	Aplicar con el objetivo de frenar el crecimiento vegetativo temporalmente. Repetir cada 15 días hasta complementar como máximo 3 aplicaciones.
Maíz	1,5 L/ha	Aplicar en estado R3.
Palto	4 - 5 L/ha	Aplicar en floración.

### Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.

Condiciones de venta:

- El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
- Como el almacenamiento, la época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del uso o almacenamiento no son responsabilidad del vendedor.

Compatibilidad: Cuando lo utilice como parte de un programa nutricional y/o protección siga este orden de mezcla:

- 1- Agua
- 2- NITRATE BALANCER®
- 3- Agroquímico

Stoller en su región es:

XV Región Alvaro Villaruel +56 9. 3 224 0339	III Y IV Región Ulises Pizarro   Felipe Pizarro +56 9. 9 534 2016   +56 9. 3 443 3941	V Región Luisa Baeza +56 9. 6 845 3268	Región Metropolitana Oriana Reyes   Josefa Bitsch +56 9. 4 248 8538   +56 9. 3 379 4332	VI Región Alejandro Guajardo   Nicolás Torres +56 9. 8 916 2012   +56 9. 9 451 4354
VII Región Paula Vargas   Nicole Guzmán +56 9. 9 451 4384   +56 9. 3 469 1858	VIII Región Luis Milla +56 9. 9 630 6790	IX Región Camilo Quezada +56 9. 4 010 6875	XIV y X Región Antonio Villagra +56 9. 9 537 5239	Jefe Regional Zona Norte (III a VI) Fredy Morales +56 9. 9 451 4385
				Jefe Regional Zona Sur (VII a XIV) Claudio Romero +56 9. 9 161 8424



Para consultas técnicas contactarse con él  
Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con él  
Departamento Técnico de Stoller de Chile S.p.A.

stoller@stoller.cl  
www.stoller.cl

Fabricado por STOLLER EUROPE S.L.U  
Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC.

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó, Chile.  
Teléfono +56 (75) 2 314 789

®Marca Registrada de Stoller de Chile S.p.A.